




## การรักษาผู้ป่วย เส้นเลือดหัวใจตีบตัน



วันก่อน หมอไปเยี่ยมพี่สาวที่บ้านในเมือง เห็นตะกร้าใบใหญ่เต็มไปด้วย  
ถุงพลาสติกใส่ของแห้งมัดอยู่เป็นชุดๆ มองไปว่ามีอะไร พบว่าประกอบด้วยเห็ดหูหนู  
ดำกับเม็ดพุทราจีนแห้ง พี่สาวบอกว่าได้สูตรยานี้มา ลองทำดูไม่ยากเลยจัดเป็นชุด  
รับประทานเองพร้อมแจกผู้สนใจ พอพูดจบ เธอก็หยิบน้ำที่ได้จากเคียวมาให้หมอ  
ชิมดู เป็นน้ำที่ขุ่นหน่อยไม่เหมือนน้ำขุปแกงที่เราทานประจำ รสประหล่มๆ ไม่ขม  
ไม่หวาน หมอมองดูส่วนผสมที่พิมพ์แจกด้วยแล้วคิดว่าไม่มีอะไรอันตราย เลยขอ  
เธอมาเพื่อบอกเล่าต่อ บังเอิญหมอเรียนมาแต่แพทย์แผนปัจจุบัน เลยไม่สามารถจะ  
วิเคราะห์ได้ พวกเราต้องหาข้อมูลต่อเองนะคะ

ผู้ป่วยที่มีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบตัน กำลังคิดจะไปผ่าตัดทำบายพาส หรือ  
ใส่บอลลูน ให้ลองกินยานี้ประมาณ 30-45 วัน รับประทานเป็นปกติ ไม่ต้องไปผ่าตัด  
ทำบายพาสอย่างแน่นอน วิธีรักษานั้นไม่ยาก มีดังนี้

### ส่วนผสม

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. เห็ดหูหนูดำ (หรือดำแซมขาว) | ประมาณ 1.5 ตำลึง (60 กรัม) |
| 2. เนื้อหมูไม่ติดมัน          | ประมาณ 2 ตำลึง (80 กรัม)   |
| 3. พุทราจีน                   | 10 ลูก                     |
| 4. ขิงสด                      | 8 แผ่น                     |
| 5. น้ำสะอาด                   | ประมาณ 8 ขาม               |

### วิธีทำ

ให้เอาส่วนผสมทั้งหมด มาต้มรวมกัน โดยใช้ไฟอ่อนๆ เคี่ยวจนเหลือ  
น้ำ 2 ขาม กินก่อนอาหารทุกวัน ประมาณ 30-45 วัน เส้นเลือดจะหายตีบตัน  
เป็นปกติ สำหรับท่านผู้ที่มีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป ควรกินอาทิตย์ละ 2 - 3 วัน  
รับประทานจะไม่มีอาการเส้นเลือดตีบตัน หายเป็นปกติ

ยาสูตรนี้มีเศรษฐีชาวไต้หวันคนหนึ่ง มีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบตันอย่าง  
รุนแรง ต้องเดินทางไปผ่าตัดทำบายพาส ณ โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในอเมริกา  
หมอให้ลงทะเบียนต่อคิวนัดอีก 45 วัน จึงจะทำการผ่าตัดให้ พอถึงวันนัด เศรษฐี  
ชาวไต้หวันผู้นี้ก็ไปตามที่หมอนัด ก่อนทำการผ่าตัดหมอไปฉีดยาแก้ปวด ปรากฏว่า  
เส้นเลือดหัวใจทุกเส้นไม่มีอาการตีบตันแต่อย่างใด หมอฝรั่งตกตลิ่งมาก สอบถาม  
คนไข้ว่าไปกินอะไรมา คนไข้ก็เล่าให้ฟังตามความจริงว่า ระหว่างรอผ่าตัดอยู่ มี  
ญาติพี่น้องที่นี้เกรงว่าระหว่างช่วงเวลารอการผ่าตัดอยู่ อาจเกิดอาการรุนแรงขึ้นได้  
จึงแนะนำให้กินยานี้ไปก่อนทุกๆ วัน จนอาการหายเป็นปกติโดยไม่รู้ว่า

ท่านที่เป็นโรคหัวใจตีบตัน หรือกำลังอยู่ในระหว่างรอการตรวจโรคนี้ ลอง  
ทำกินดูเถิด หายแล้ว หรือดีขึ้น โปรดบอกต่อๆ ไปเป็นวิทยาทาน

